

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 29-5-81697666

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

(AUDE GARD HERAULT LOZERE PYRENEES ORIENTALES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE BAT 5 PLACE CHAPTAL

34076 MONTPELLIER CEDEX TEL 92.41 42

ABONNEMENT ANNUEL 40 F

Régisseur de recettes de la D.D.A

C.C.P. Montpellier 5238-67

Le 27 Mai 1981

ÉDITION du LIMOUXIN N° 5

Avis rédigé en collaboration avec la C.A.V.A.L.E.

VIGNE

MILDIU : sur l'ensemble du réseau, le premier traitement anti-mildiou est à réaliser avant le 2 juin.

BOTRYTIS : ce champignon est particulièrement actif sur tous les secteurs ; nous sommes donc amenés à vous préconiser parmi les nombreuses spécialités anti-mildiou celles qui contiennent un anti-botrytis.

Toutefois si vous utilisez un fongicide ne contenant pas d'anti-botrytis, il convient d'associer en mélange, une spécialité destinée à lutter contre cette maladie.

Consulter votre technicien.

- Anti-mildiou préventifs (avec action secondaire anti-botrytis) (dose produit commercial) :

TURBOFAL : 5 kilos/hectare ; CUPROFIX F : 5 kilos/hectare ; PHALTOCUIVRE : 5 kilos/hectare ; MYCODIFOL F : 4 litres/hectare ; SANDOCAPTE : 2 kilos/hectare ; ORGANIL 648 : 5 kilos/hectare.

- Anti-mildiou à action pénétrante ou systémique :

(cymoxanile)	:	ANTEOR	:	3 kilos/hectare
		REMILTINE	:	2 kilos/hectare
(métalaxyl)	:	ACYLON F	:	1,100 kilo/hectare
(milfurame)	:	CALTAN	:	2 litres/hectare
(ethylphosphite d'aluminium)	:	MIKAL	:	3 kilos/hectare

OIDIUM : toujours aussi virulent. Vous devez ajouter au produit anti-mildiou, une des spécialités suivantes : MICROTHIOL spécial ou THIOVIT (8 à 10 kilos à l'hectare) ; RUBIGAN 4 à raison de 0,300 litre/hectare ou BAYLETON 5 : 1 kilo/hectare.

Nous vous conseillons après ce traitement mixte mildiou-oïdium de faire un soufrage à 40 kilos/hectare dès que les conditions climatiques le permettront.

TORDEUSES : sur l'ensemble du réseau piégeage, les captures d'Eudémis et, plus tardivement, de Cochylis ont été notées; l'évolution des pontes a été contrariée par le mauvais temps. On observe actuellement des oeufs et les toutes premières chenilles sur Chardonnay.

Attendre un avis de traitement ultérieur.

1'INGENIEUR en CHEF d'AGRONOMIE
CHEF de CIRCONSCRIPTION,

V. LAGAUE

Tirage du 27 mai 1981 - 1000 exemplaires.